

AUTOVACCIN Nr.

SUSPENSIE BUVABILĂ (PER OS) 10 miliarde bacterii/ml
--

Informații necesare a fi cunoscute înainte de administrarea produsului:

- Citiți cu atenție și în întregime acest prospect, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. Este posibil să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau sfaturi întrebați medicul dumneavoastră.

Grupa farmacoterapeutică: vaccin bacterian.

Compoziția:

- Tulpina nr. inactivată prin căldură (10 miliarde bacterii/ml);
- Excipienți: apă pentru preparate injectabile, clorura de sodiu 0,9% (9 mg/ml);
- Nu conține prezervant antimicrobian.

Aspect:

- În repaos: lichid opalescent, cu sediment uniform;
- După agitare: suspensie opalescentă, omogenă.

Indicații terapeutice:

- Infecții cronice recidivante provocate de bacteria din care a fost preparat autovaccinul;
- Se recomandă persoanelor care prezintă contraindicații pentru autovaccinul injectabil și / sau în perioada de pauză (minim 3 luni) a autovaccinului injectabil;
- Prezintă eficiență crescută (prin stimulare IgA secretor) în infecțiile bacteriene ale aparatului respirator superior / inferior, infecții urinare;
- În celelalte tipuri de infecții bacteriene efectul este mai scăzut;
- Se sugerează (cu avizul medicului curant) asocierea cu antibioterapie conform antibiogramei și eventual cu un imunomodulator.

Contraindicații:

- Nu se cunosc, este în general bine tolerat.

Precauții privind administrarea produsului:

- Înainte de deschiderea fiolei (la punctul de rupere), conținutul fiolei se omogenizează prin agitare energică pentru antrenarea componentei active.

Interacțiuni:

- Se va evita administrarea concomitentă cu preparate cortizonice, citostatice / radioterapie, alte vaccinuri bacteriene, vaccin polio.

Atenționări speciale:

- Se administrează numai pe cale orală (buvabil).
- Nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Doze și mod de administrare:

- Se administrează la adulți și copii;
- Doza recomandată este de 1 fiolă x 5 ml / zi, total 30 fiole / lună;
- Se administrează pe cale orală (buvabil) 1 fiolă x 5 ml / zi, de preferat dimineața cu 30 minute înainte de masă sau 2 – 3 ore după masă;
- Conținutul fiolei se pune în 15 – 20 ml lichid și se omogenizează;
- Se bea lent (cu înghițituri mici, în aproximativ 30 minute);
- Pentru consolidarea/potențarea răspunsului imun individual, se pot solicita 1-2 rapeluri (repetări) la interval de 30-45 zile între rapeluri;
- Se poate administra vaccinul gripal (când este cazul) în intervalul de 30-40 zile de pauză între rapeluri (repetări);
- În cazul în care infecția persistă, se face un control prealabil înaintea solicitării rapelului;

- Atunci când infecția nu mai este prezentă, dar se urmărește consolidarea răspunsului imun individual, se poate solicita un rapel din tulpina bacteriană inițială, care este păstrată 6 luni de la prelevare;
- Verificarea prezenței/absenței infecției se poate efectua prin control bacteriologic la două săptămâni de la sfârșitul administrării sau când apar fenomene clinice.

Reacții adverse:

- Nu se cunosc reacții adverse și nu s-au semnalat, dar comunicați medicului oricare din reacțiile adverse apărute în cursul tratamentului și care nu sunt cuprinse în acest prospect.

Păstrare:

- Autovaccinul buvabil se folosește până la data expirării înscrisă pe cutie și pe fiole;
- Se păstrează la temperaturi între 2 - 8°C (la frigider);
- Nu se congelează;
- Nu se utilizează fiole fisurate, neetichetate sau cu aspect modificat;
- A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Ambalaj:

- 30 fiole x 5 ml / fiol

Producător: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino”, Splaiul Independenței 103, sector 5, 050096 Bucuresti, telefon, 021.3069.258 / 021.3069.214 Fax: 3069305, e-mail: office.cantacuzino@mapn.ro, adresa web: „www.cantacuzino.mapn.ro

Data ultimei verificări a prospectului: februarie 2025.